

TROPIC

La mejor maduración y engorde para su cultivo.



Líquido soluble SL



Engorde y maduración



Aplicación en fertirrigación



Aplicación foliar



Aplicación en hidroponía

Acciones

Abono mezcla de aminoácidos que debido a su alto contenido en potasio de rápida asimilación por la planta y su contenido en metionina, hacen de este preparado un fabuloso producto para mejorar la maduración del fruto.

Época de aplicación


Se aconseja aplicar este producto cuando sea necesario favorecer la maduración del fruto. Aplicar una vez formado el fruto. Repetir dos aplicaciones.

Riquezas garantizadas

Aminoácidos libres	2,3% (p/p)
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	14% (p/p)
Cobre (Cu) total	0 mg/kg
pH	6-7
Zinc (Zn) total	0 mg/kg
Cloro (Cl) total	0 mg/kg

Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación. Clase C.

Contenido efectivo



20L

24,4-24,6 kg

5L

6,10-6,15 kg

Dosificación

FOLIAR

TODOS	200 cc/100 L agua	Cada 7-10 días
-------	-------------------	----------------

FERTIRRIGACIÓN

TODOS	2-3 L/Ha	Cada 7-10 días
-------	----------	----------------

HIDROPONÍA

TODOS	1-1,5 L/Ha	Cada 7-10 días
-------	------------	----------------

Aminograma

- Metionina: 100%

Aminoácidos obtenidos mediante hidrólisis ácida y mediante fermentación con Escherichia coli, de proteínas vegetales.

1

Aumenta el calibre del fruto debido a su aportación de potasio orgánico, fácilmente asimilable, mejora la producción de etileno gracias a sus precursores, por lo que adelanta la maduración del fruto, y aumenta el contenido en grados Brix.

